

NGÔ LAI

NK4300

*“Cây khỏe bắp to,
không lo gì hạn”*

Ưu thế vượt trội:

- +** *Năng suất cao, ổn định.*
- +** *Cứng cây chịu hạn.*
- +** *Thích hợp “treo đèn”.*

KỸ THUẬT CANH TÁC

1. Thời gian sinh trưởng:

Thời gian sinh trưởng 105-115 ngày (miền Bắc).

2. Thời vụ

Thích hợp trồng ở Miền Bắc trong các Vụ Xuân, Vụ Hè, Vụ Đông.

Khả năng tích trữ sau thu hoạch tốt, thích hợp treo đèn ở vùng núi phía Bắc.

3. Khoảng cách và mật độ trồng

Gieo một hốc một hạt.

- Khoảng cách trồng: 70 cm x 30 cm hoặc 75 cm x 25 cm.
- Mật độ từ 54,000 - 55,000 cây/ha.

4. Chăm sóc

4.1 Phân bón

Lượng phân bón:

Loại phân	kg/360m ²	kg/500m ²	Kg/ 1000 m ²	Kg/ 1 ha
Phân chuồng	180 - 360	250 - 500	500 - 1000	5000 - 10.000
Đạm urea	11 - 15	15 - 20	30 - 40	
Super Lân	11 - 18	20 - 25	40 - 50	400 - 500
Kali	4 - 6	6 - 8	11 - 15	110 - 150

+ Bón lót (trước khi gieo): toàn bộ phân lân + phân chuồng (nếu có)

+ Thúc 1 (khi ngô 3 - 4 lá): Bón 1/3 lượng Urea + 1/3 lượng Kali

+ Thúc 2 (khi ngô 7 - 9 lá): Bón 1/3 lượng Urea + 1/3 lượng Kali

+ Thúc 3 (trước trổ cờ 3 - 5 ngày): Bón hết lượng phân còn lại.

- Lưu ý:

+ Tham khảo thêm ý kiến của cán bộ nông nghiệp địa phương để điều chỉnh lượng phân và cách bón cho phù hợp với điều kiện canh tác địa phương.

+ Tránh bón phân tiếp xúc trực tiếp với hạt giống hoặc cây con gây ảnh hưởng tỷ lệ nảy mầm và phát triển của cây.

4.2 Quản lý dịch hại (đề nghị đọc kỹ nhãn các loại thuốc BVTV trước khi sử dụng)

- Dọn cỏ trước khi làm đất bằng Glyphosan 480SL, liều lượng 3-4 lít/ha.

- Xử lý hạt giống bằng cách hòa 2ml thuốc Cruiser Plus 312.5 FS với 8ml nước, trộn đều cho mỗi 1 kg hạt giống trước khi gieo để phòng trừ sâu xám giai đoạn cây con.

- Phòng trừ sâu đục thân, đục trái bằng Virtako 40WG, liều lượng 75 g/ha, sau khi bướm ra rộ 5 - 7 ngày.

- Phòng trừ bệnh đốm lá, rỉ sắt bằng Amistar Top 325SC, liều lượng 0,5 lít/ha, giai đoạn 35 - 40 ngày sau gieo (10 - 12 lá).

4.3 Quản lý nước

Tránh để ruộng ngập úng. Đảm bảo đủ ẩm các giai đoạn cây con 3 - 5 lá, 10 - 12 lá và đặc biệt trước, sau trở cày phun râu 2 tuần.

5. Thu hoạch và bảo quản

Nên thu hoạch đủ độ chín để đảm bảo năng suất và màu hạt đẹp. Khi bảo quản cần phơi/ sấy hạt về độ ẩm 15% để tránh mối mọt.

CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM