

NGÔ LAI

NK6326

Tốt giống, an tâm

Ưu thế vượt trội:

- + **Năng suất cao, ổn định.**
- + **Cứng cây gọn lá.**
- + **Lõi nhỏ, hạt sâu cay, dễ tách.**

KỸ THUẬT CANH TÁC

1. Thời gian sinh trưởng:

Thời gian sinh trưởng 95-100 ngày ở miền Nam và 105-115 ngày ở miền Bắc.

2. Thời vụ

Trồng được các vụ trong năm.

- + Miền Nam: Vụ 1, Vụ 2 và vụ Đông Xuân.
- + Miền Bắc: Vụ Xuân, Vụ Hè, Vụ Đông.

3. Khoảng cách và mật độ trồng

Gieo một hốc một hạt.

Khoảng cách và mật độ gieo trồng tùy theo mùa vụ:

- + Vụ 1 và Vụ 2: Khoảng cách gieo : 70 cm x 20 cm, mật độ 71.000 cây/ha.
- + Vụ Đông Xuân: nên xuống giống sớm ở Đông Nam Bộ (trước 25/12 hàng năm); Gieo 60 cm x 20 cm (mật độ 81.000 cây/ha).

+ Vụ Xuân, Hè: gieo khoảng cách 70cm x 25cm đến 70cm x 20cm, mật độ 57.000 - 71.000 cây/ha.

+ Vụ Đông: nên xuống giống trước 25/9 hàng năm; khoảng cách gieo 70cm x 25cm hoặc 60cm x 25cm, mật độ 57.000-67.000 cây/ha.

Lưu ý: Trồng đúng mật độ khuyến cáo để tránh tình trạng xảy ra trái chìa.

4. Chăm sóc

4.1 Phân bón

Lượng phân bón:

| Loại phân | Sào Bắc Bộ (kg/360m ²) | Sào Trung Bộ (kg/500m ²) | Kg/ 1000 m ² | Kg/ 1 ha |
|-------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------|
| Phân chuồng | 180 - 360 | 250 - 500 | 500 - 1000 | 5000 - 10.000 |
| Đạm urea | 11 - 15 | 15 - 20 | 30 - 40 | 300 - 400 |
| Super Lân | 11 - 18 | 20 - 25 | 40 - 50 | 400 - 500 |
| Kali | 4 - 6 | 6 - 8 | 11 - 15 | 110 - 150 |

+ Bón lót (trước khi gieo): toàn bộ phân lân + phân hữu cơ (nếu có)

+ Thúc 1 (khi ngô 3 - 4 lá): Bón 1/3 lượng Urea + 1/3 lượng Kali

+ Thúc 2 (khi ngô 7 - 9 lá): Bón 1/3 lượng Urea + 1/3 lượng Kali

+ Thúc 3 (trước trổ cờ 3 - 5 ngày): Bón hết lượng phân còn lại.

- *Lưu ý:*

+ *Tham khảo thêm ý kiến của cán bộ nông nghiệp địa phương để điều chỉnh lượng phân và cách bón cho phù hợp với điều kiện canh tác địa phương.*

+ *Tránh bón phân tiếp xúc trực tiếp với hạt giống hoặc cây con gây ảnh hưởng tỷ lệ nảy mầm và phát triển của cây.*

4.2 Quản lý dịch hại (đề nghị đọc kỹ nhãn các loại thuốc BVTV trước khi sử dụng)

- Dọn cỏ trước khi làm đất bằng Glyphosan 480SL, liều lượng 3-4 lít/ha.

- Xử lý hạt giống bằng cách hòa 2ml thuốc Cruiser Plus 312.5 FS với 8ml nước, trộn đều cho mỗi 1 kg hạt giống trước khi gieo để phòng trừ sâu xám giai đoạn cây con.
- Phòng trừ sâu đục thân, đục trái bằng Virtako 40WG, liều lượng 75 g/ha, sau khi bướm ra rộ 5 - 7 ngày.
- Phòng trừ bệnh đốm lá, rỉ sét bằng Amistar Top 325SC, liều lượng 0,5 lít/ha, giai đoạn 35 - 40 ngày sau gieo (10 - 12 lá).

4.3 Quản lý nước

Tránh để ruộng ngập úng. Đảm bảo đủ ẩm các giai đoạn cây con 3 - 5 lá, 10 - 12 lá và đặc biệt trước, sau trổ cờ phun râu 2 tuần.

5. Thu hoạch và bảo quản

Nên thu hoạch đủ độ chín để đảm bảo năng suất và màu hạt đẹp. Khi bảo quản cần phơi/ sấy hạt về độ ẩm 15% để tránh mốc mọt.

CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM