

DƯA HẦU LAI F1 **PHÙ ĐỔNG** WD 1317

“Lớn nhanh như thổi”

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị đất:

- Chọn đất trồng: không nên trồng trên đất đã canh tác cây họ bầu bí dưa.
- Bón vôi 50 - 100kg/1000m², phơi đất ít nhất 10 ngày.
- Bón lót (1000m²): 2m³ phân chuồng hoai mục + 40-50kg NPK 20:20:15
- Làm líp cách nhau 4,5 – 5m; cao 0,4m; ngang 0,8m
- Líp được phủ bạt plastic đục lỗ với khoảng cách thích hợp để trồng.

2. Mật độ, khoảng cách:

Tùy theo đất tốt xấu và thời tiết từng vụ để lựa chọn mật độ trồng thích hợp.

- Trồng líp đôi: hàng cách hàng (tính từ giữa líp) 4.5-5.0m; nếu líp đơn 2.5 – 3.0m
- Líp được phủ bạt plastic đục lỗ, khoảng cách 2 lỗ bạt (cây x cây): 0.35 – 0.4m

3. Ngâm ủ hạt giống:

- Lượng giống: 40-50 gr/1000 m².
- Ngâm hạt 5 – 6 giờ trong nước sạch (hạt no nước), vớt ra rửa sạch chất nhờn, sau đó ủ ấm bằng khăn/vải sạch, từ 32 – 36 giờ, khi hạt nứt nanh đem ra gieo.
- Ủ khô: không cần ngâm nước, rải đều một lớp hạt khô giữa hai lớp khăn bông ẩm, cuộn lại cho vào túi nilon, buộc kín ủ 32 – 36 giờ.
- Chú ý trong điều kiện lạnh phải giữ ấm hạt khi ủ và tránh để hạt nứt mầm quá dài khi gieo để bị gãy
- Nếu gieo hạt trong bầu/vĩ: khi cây vừa chớm ra 1-2 lá nhám là đem trồng ra ngoài đồng.

4. Bón phân: (Tính cho 1000m²). Tùy theo biểu hiện sinh trưởng tốt xấu của cây để chọn lượng phân bón thích hợp

- Thúc lần 1 (15-20 ngày trồng): 20-35kg NPK 20:20:15 + 3-4 kg Canxi Nitrat 26%
- Thúc lần 2 (29-35 ngày sau trồng): 20-35kg NPK 20:20:15 + 3-4 kg Canxi Nitrat 26%
- Tưới phân (42- 50 ngày sau trồng): Hòa nước 2.0-4.0 kg NPK 20:20:15 + 2-3 kg KCl, tưới 2-3 lần, cách 3-4 ngày/lần.
- Để tăng độ chín đỏ đẹp và hàm lượng đường, phun nhẹ Sufat Kali 100g/16 lít lúc 3 ngày trước khi thu hoạch.
- Nên bổ sung phân trung vi lượng (Ca, Mg, Bo, Zn, Si...) với liều lượng và phương pháp sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì.

5. Tỉa chèo, bới và lấy trái:

- Mỗi gốc dưa có thể để 1 dây chính và 2 dây chèo hoặc ngắt ngọn lúc 13-17 ngày sau trồng để 2 dây chèo.
- Ngắt ngọn sau khi lấy trái 7 ngày cách cuống trái 6-7 lá, kết hợp cắt tỉa dây bới.
- Mỗi gốc dưa để một trái lấy ở vị trí nụ thứ 3, nụ thứ 4 trên dây chính hoặc nụ thứ 2, nụ thứ 3 trên dây chèo.

MỘT SỐ LOẠI BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÂY DƯA HẦU

BỆNH SƯƠNG MAI

- Bệnh sương mai do nấm *Pseudoperonospora cubensis* gây ra.

Bệnh xuất hiện rất nhiều trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển của cây dưa hấu và ảnh hưởng đáng kể đến năng suất.

- Bệnh xuất hiện trên lá, lúc đầu màu xanh nhạt, sau đó chuyển thành màu vàng, rồi thành màu nâu nhạt, hình góc cạnh. Trong điều kiện ẩm ướt phía dưới có xuất hiện sợi nấm rất rõ.

- Cách phòng trị: Phun thuốc Amistar 250SC.

BỆNH NỨT THÂN XÌ MÙ

- Do nấm *Didymella bryoniae* gây ra. Bệnh thường xuất hiện giai đoạn sau lấy trái. Bệnh có thể xuất hiện trên lá hoặc trên thân. Nếu không phòng trừ kịp thời có thể làm chết cây hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất.

- **Cách phòng trị:**

Sử dụng **Revus Opti 440SC**. Phun khi bệnh mới chớm xuất hiện.

BỆNH THÁN THƯ

- Bệnh thán thư do nấm *Collectotrichum lagenarium*. Bệnh thường gây hại nặng trong mùa mưa hoặc những thời điểm có độ ẩm cao. Bệnh thường xuất hiện ở giai đoạn sau khi lấy trái và ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Bệnh thường xuất hiện trên lá, lây lan rất nhanh và làm hỏng bộ lá, làm thối quả và ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng dưa hấu.

- Cách phòng trị: Sử dụng Amistar 250SC.