

## KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

### 1. Thời vụ:

Có thể trồng ở nhiều thời vụ khác nhau:

- Vụ sớm: tháng 7 (dương lịch).
- Chính vụ: tháng 8-10.
- Vụ muộn: tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

### 2. Chuẩn bị đất trồng:

- Chọn chân đất thịt nhẹ, đất phù sa cổ, đất pha cát. Ruộng trồng cà chua cần chủ động tưới tiêu.
- Cày bừa kỹ và dọn sạch cỏ dại trước khi trồng.
- Luân canh cà chua với cây khác họ, không trồng liên tục cà chua hay với cây họ cà trước đó.
- Líp được phủ bạt plastic đục lỗ với khoảng cách thích hợp để trồng (40cm).

### 3. Mật độ, khoảng cách:

- Trồng luống đôi rộng 1,2-1,4m; luống cao 20-30cm, hàng cách hàng 50-60cm, cây cách cây 40-45cm. Luống đơn 0,9-1m, trồng cây cách cây 40-50cm.
- Mật độ trồng 800-900 cây/sào (360m<sup>2</sup>).

### 4. Chăm sóc:

- Làm giàn cao 1,6 – 2m, có 2-3 tầng giàn ngang.
- Tỉa cành: mỗi cây giữ lại 2 thân chính, Tỉa bỏ các nhánh bên, lá già, lá bệnh.

### 5. Bón phân: (Tính cho 360m<sup>2</sup>).

- Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai mục 500kg + 20kg vôi bột + 15kg Super Lân

- Thúc lần 1 (20-25 ngày sau trồng): 5-10kg NPK (20:20:15)
  - Thúc lần 2 (40-45 ngày sau trồng): 5-10kg NPK (20:20:15) + 2kg KCl
- Sau mỗi lần thu quả cần bón bổ sung cho cây từ 3-5 kg NPK (20:20:15).

### **Chú ý:**

- Hạn chế dùng các loại phân đơn bón cho cà chua. Đặc biệt không nên bón nhiều đạm. Nên dùng các loại phân NPK, phức hợp như phân Đầu Trâu, NPK Lâm Thao...Căn cứ vào hiện trạng trên đồng, bà con có thể dùng các loại phân chuyên dụng cho cà theo chỉ dẫn như Agrivet. Phân Delta...nhằm giúp cho cây tăng khả năng kháng bệnh, tăng năng suất, chất lượng nông sản.
- Bà con có thể giâm cây trong vườn ươm từ 7-10 ngày sau đó trồng ra ruộng.

## **MỘT SỐ LOẠI BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÂY CÀ CHUA**

### **BỆNH SƯƠNG MAI**

- Bệnh sương mai do nấm *Phytophthora infestans* gây ra.
- Bệnh xuất hiện rất nhiều trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, độ ẩm không khí cao. Bệnh gây hại nặng ở giai đoạn nuôi trái.
- Bệnh xuất hiện trên lá, cành và trên quả, phía dưới vết bệnh có xuất hiện sợi nấm rất rõ.
  - Cách phòng trị: Phun thuốc **Amistar 250SC, Revus Opti 440SC**.



Bệnh sương mai trên thân lá và trái

## **BỆNH KIM CHÂM (BẢ TRẦU)**

- Do nấm *stemphylium solani* hoặc vi khuẩn *Xanthomonas campestris* gây ra. Bệnh thường xuất trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cây nhưng gây hại nặng ở giai đoạn nuôi quả. Bệnh có thể xuất hiện chủ yếu trên lá hoặc trên thân. Nếu không phòng trừ kịp thời có thể làm chết cây bị hủy hoại nhanh chóng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, thậm chí thất thu.

### **- Cách phòng trị:**

Dùng **Revus Opti 440SC** (2 lít+300-500 lít nước), phun khi bệnh chớm xuất hiện.



Bệnh châm kim (bả trầu)

## **BỆNH VÀNG XOĂN LÁ CÀ CHUA (BỆNH HỦI)**

- Bệnh vàng xoắn lá (bệnh hủi) do virus gây ra. Virus được lây lan thông qua bọ phấn trắng. Bệnh thường gây hại nặng trong mùa nắng (thời điểm trái vụ ở miền Bắc). Bệnh thường gây hại nặng ở giai đoạn cây bắt đầu ra hoa, làm mất sức sinh trưởng, thậm chí thất thu lớn đến năng suất.

- Cách phòng trị: Phun thuốc có hoạt chất Pymetrozin để diệt côn trùng trung gian.



Bệnh vàng xoắn lá cà chua